

Medicamentos Comunes Para la Diabetes

Nombre del medicamento	Cuando tomarlo	Algunos efectos secundarios para informar a su enfermera/o practicante o médico
Insulina (Levemir, Detemir, Lantus-glargine)	<ul style="list-style-type: none"> • Todos los días, a la misma hora • Tomar con la comida 	⇒ Azúcar baja en la sangre ⇒ Sarpullido ⇒ Aumento de peso ⇒ Dolor de cabeza
Glipizida (Glucotrol)	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar siempre con las comidas • Su enfermera(o) le dirá cuándo y cuánto debe tomar, si le recetan Glipizide 	⇒ Azúcar baja en la sangre ⇒ Diarrea/Náuseas ⇒ Mareo/Dolor de cabeza
Actos (Pioglitazone)	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar siempre con las comidas • Su enfermera(o) le dirá cuándo y cuánto debe tomar, si le recetan Actos 	⇒ Aumento de peso ⇒ Dolor de cabeza ⇒ Dolor articular
Metformina (Glucophage)	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar siempre con las comidas • Su enfermera(o) le dirá cuándo y cuánto debe tomar, si le recetan Metformin 	⇒ Diarrea ⇒ Náuseas/vómito ⇒ Dolor de cabeza ⇒ Sarpullido

Esta información es solo para propósitos de educación de salud. Consulte a su enfermera(o) practicante, médico o farmacéutico si tiene alguna pregunta sobre sus medicamentos o efectos secundarios.